



SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

1 de Junio de 2009

Ribereña-Reynosa y Reynosa San Fernando

EL CULTIVO DE MAIZ EN LA ZONA RIBEREÑA SE ENCUENTRA EN SU MAYORIA EN ETAPA DE MADUREZ FISIOLÓGICA.

EN GENERAL EL CULTIVO SE OBSERVA EN BUEN ESTADO, LA INFESTACION DE LARVAS DE ELOTERO YA SALIO A PUPAR Y DONDE SE ENCUENTRA PRESENTE SON LARVAS DE ÚLTIMO ESTADÍO.

SE OBSERVA MUY POCOS DAÑOS DE LARVAS DE GUSANO BARRENADOR, PERO YA NO SE ENCONTRARON LARVAS DAÑANDO LOS TALLOS Y LA BASE DE LAS MAZORCAS.

EL ATAQUE DE ARAÑA ROJA NO SE HA INTENSIFICADO Y EN GENERAL PRESENTA UNA BAJA INCIDENCIA.

YA SE TERMINO LA APLICACIÓN DEL TERCER RIEGO DE AUXILIO.

EL CULTIVO NO PRESENTA DAÑOS POR VIENTOS FUERTES Y LEVE GRANIZO OCURRIDO EN ALGUNAS AREAS.

COMO CONCLUSION PARA EL CULTIVO DE MAÍZ, A LA FECHA NO PRESENTA RIESGOS FITOSANITARIOS QUE PUDIERAN PONER EN RIESGO UNA REDUCCION EN LOS RENDIMIENTOS, MISMOS QUE SE ESPERAN SEAN ALTOS.

EL CULTIVO DE SORGO EN EL AREA DE TEMPORAL SE ENCUENTRA EN SU MAYORÍA EN ETAPA DE TRILLA EN LA PARTE NORTE (MUNICIPIO DE REYNOSA), Y EN ETAPA DE TRILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.

SE TIENE UN GRAN AVANCE EN LAS TRILLAS EN REYNOSA.

LA LABOR DE TRILLA EN EL AREA DE SAN FERNANDO, YA TERMINÓ Y LOS AGRICULTORES ESTAN REALIZANDO LA LABOR DE RASTREO DE SUS TIERRAS.

LAS PRODUCCIONES DE GRANO QUE SE ESTAN COSECHANDO SE CONSIDERAN BUENAS (DE 2 A 3 TONELADAS).

NO PRESENTAN RIESGOS FITOSANITARIOS IMPORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO AL CULTIVO, YA QUE NO SE OBSERVAN PLAGAS AFECTANDOLO.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

1 de Junio de 2009

CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	162.26	1,111.013
LAS BLANCAS	89.12	74.021
MARTE R. GOMEZ	75.24	668.339

- EXTRACCION DE LA PRESA MARTE R. GOMEZ**

1. TOMA NORTE	1.2 M ³ /SEG.
2. TOMA SUR	0.0 M ³ /SEG.
TOTAL	1.2 M³/SEG.

- EXTRACCION DE LA PRESA EL CUCHILLO**

71.779 M³/SEG.

SUPERFICIE REGADA DISTRITO DE RIEGO 026 "BAJO RÍO SAN JUAN"

RIEGO No. 1		RIEGO No. 2		RIEGO No. 3		RIEGO No. 4	
DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA
20.0	69,193.6	0	64,579.2	65.0	46,577.5	58.0	26,717.3

- PRECIPITACIONES 31/05/2009**

CD. MIER	10.2 mm.
MIGUEL ALEMAN	INAPRECIABLE
CAMARGO	2.5 mm.
DIAZ ORDAZ	3.0 mm.
REYNOSA	12.7 mm.
RIO BRAVO	INAPRECIABLE

RIO BRAVO-EMPALME-FCO. GONZALEZ VILLARREAL- SANTA APOLONIA- B E109

EN EL CASO DEL SORGO DE RIEGO HAY COMO UN 30 O 40% DE LA SUPERFICIE COSECHADA, HAY UNAS AREAS EN EL SORGO DE RIEGO QUE TIENEN MUCHA HUMEDAD EN EL SUELO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LOS ULTIMOS DIAS POR LO QUE NO SE HA PODIDO ENTRAR A COSECHAR. EN EL SORGO DE TEMPORAL QUEDARA UN 5% DE SORGO EN PIE POR LO QUE EN LOS PROXIMOS DIAS QUEDARA RECOLECTADA EL TOTAL DE LA SUPERFICIE..

EN EL CASO DEL MAIZ TODAVIA NO DA INICIO LA RECOLECCION, PERO ES MUY PROBABLE QUE EN LA PROXIMA SEMANA EMPIECE A COSECHARSE LOS MAICES QUE SE SEMBRARON DEL 10 AL 15 DE ENERO DEL 2009