



SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

4 de Mayo de 2009

Ribereña-Reynosa y Reynosa San Fernando

EL CULTIVO DE MAIZ EN LA ZONA RIBEREÑA SE ENCUENTRA ENTRE LA ETAPA DE JILOTE (GRANO AMPOLLA) Y ELOTE (GRANO LECHOSO).

EN GENERAL SE OBSERVA EN EXCELENTES CONDICIONES Y PRESENTA INFESTACION DE BAJA A MEDIA DE LARVAS DE GUSANO ELOTERO EN LOS ESTIGMAS DE LOS JILOTES Y EN LAS PUNTAS DE LOS ELOTES.

NO SE OBSERVAN DAÑOS EN LA PARTE MEDIA DE ELOTES CAUSADOS POR GUSANO COGOLLERO, POR LO QUE ESTE AÑO ESPERAMOS TENER MENORES INFECCIONES POR ENFERMEDADES FUNGOSAS EN MAZORCAS.

NO SE HAN DETECTADO DAÑOS POR GUSANO BARRENADOR EN TALLOS Y AREA BASAL DE ELOTES.

EL ATAQUE DE ARAÑA ROJA NO SE HA INTENSIFICADO Y EN GENERAL PRESENTA UNA BAJA INCIDENCIA.

SE ESTA TERMINANDO DE APLICAR EL SEGUNDO RIEGO DE AUXILIO, Y HA DADO INICIO LA APLICACIÓN DEL TERCER RIEGO DE AUXILIO.

EL CULTIVO DE SORGO EN EL AREA DE TEMPORAL SE ENCUENTRA EN LAS ETAPAS DE GRANO MASOSO EN LA PARTE NORTE (MUNICIPIO DE REYNOSA), Y GRANO MASOSO A MADUREZ FISIOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.

SE HA INICIADO LA LABOR DE TRILLA EN EL AREA DE SAN FERNANDO, SOBRE TODO EN LOS PREDIOS MAS ESTRESADOS POR LA SEQUIA, EN LOS QUE EL FOLLAJE ESTA SECO Y CON PELIGRO DE ACAMARSE DEBIDO A LOS FUERTES VIENTOS QUE SE HAN PRESENTANDO LAS ULTIMAS SEMANAS.

LAS PRODUCCIONES DE GRANO QUE SE ESTAN COSECHANDO SE CONSIDERAN BUENAS (DE 2 A 3 TONELADAS).

NO PRESENTAN RIESGOS FITOSANITARIOS IMPORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO AL CULTIVO, YA QUE NO SE OBSERVAN PLAGAS AFECTANDOLO Y LA INFECCION DE ROYA SE CONSIDERA BAJA.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

4 de Mayo de 2009

CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	163.70	1,305.090
LAS BLANCAS	89.30	76.217
MARTE R. GOMEZ	79.79	607.428

- **EXTRACCION DE LA PRESA MARTE R. GOMEZ**

- TOMA NORTE 5.0 M³/SEG.
- TOMA SUR 56.0 M³/SEG.
- TOTAL 61.0 M³/SEG.**

SUPERFICIE REGADA DISTRITO DE RIEGO 026 "BAJO RÍO SAN JUAN"

RIEGO No. 1		RIEGO No. 2		RIEGO No. 3		RIEGO No. 4	
DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA
9.0	68,810.3	851.3	53,498.1	1,226.3	29,661.6	599.3	2,405.2

**RIO BRAVO-EMPALME-FCO. GONZALEZ VILLARREAL-
SANTA APOLONIA- B E109**

EL CULTIVO DE MAIZ EN EL AREA DE RIO BRAVO, REYNOSA Y MATAMOROS SE ENCUENTRA EN ETAPA DE JILOTE A GRANO MASOSO CON LAS LLUVIAS QUE SE REGISTRARON EL 19 DE MARZO, HUBO UNA DISMINUCIÓN EN LA INCIDENCIA DE ARAÑA ROJA, NO ASI EN EL CASO DEL ELOTERO Y COGOLLERO, ACTUALMENTE SE HAN REGISTRADO BROTES DE ARAÑA ROJA POR LO QUE ES RECOMENDABLE QUE LOS PRODUCTORES INSPECCIONEN SUS PREDIOS DE MAIZ Y SI LO REQUIERE, HAGAN APLICACIONES PARA DICHO ACARO DE LO CONTRARIO SUS CULTIVOS SE VERAN AFECTADOS YA QUE LA MAYOR PARTE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ELOTE.

EN EL SORGO DE TEMPORAL LA MADURACION SE ENCUENTRA DE GRANO MASOSO A GRANO COLOREANDO Y LAS LLUVIAS QUE SE REGISTRARON EL 19 DE ABRIL AYUDARON PARA QUE LA PLANTA NO SE DESHIDRATARA Y AL LLENADO DE GRANO.

EN EL SORGO DE RIEGO AUNQUE LOS PUNTOS DE MUESTREO SE ENCUENTRA DE GRANO LECHOSO HASTA GRANO COLOREANDO HAY ALGUNOS LOTES QUE TODAVIA NO HAN ESPIGADO, ES MUY PROBABLE QUE ESTAS PERSONAS REGARON TARDE DE ASIENTO Y TAMBIEN LOS QUE RESULTARON AFECTADOS POR LA HELADA QUE SE REGISTRO EN MARZO Y RESEMBRARON DE SORGO, SU DESARROLLO ES EN ESTADO DE PLANTULA.,